



PRÉSENTATION

Clinutren® boisson 2kcal épaissie est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales avec sucres et édulcorant. Aliment hyperénergétique et hyperprotéiné.

Nutrition orale pour les besoins nutritionnels des patients adultes en cas de dénutrition associée à des troubles de la déglutition (dysphagie oropharyngée). En complément de l'alimentation quotidienne lorsque celle-ci, même enrichie, ne peut suffire à couvrir les besoins nutritionnels. Il convient de s'assurer que la consistance est adaptée aux capacités de déglutition du patient.

SPÉCIFICITÉS PRODUIT

- **Le seul CNO lacté épaissi prêt à l'emploi***
- **Garanti un niveau IDDSI 3 stable dans le temps**
- **400kcal (2kcal/ml) et 20 g de protéines/200ml**
- **Résistant à l'amylase salivaire¹**

CARACTÉRISTIQUES

- Énergie : 400 kcal pour 200 ml (2,0 kcal/ml)
- Répartition de l'Apport Énergétique Total (AET) :
 - ✓ **Protéines : 20 %** de l'AET (soit 20 g pour 200 ml)
 - ✓ **Glucides : 44 %** de l'AET
 - ✓ **Lipides : 36 %** de l'AET
- Niveau IDDSI 3 stable dans le temps

Épaississant : amidon de maïs modifié (phosphate de diamidon hydroxypropylé) résistant à l'amylase salivaire¹

Stérilisé U.H.T. Conditionné sous atmosphère protectrice. **Sans gluten**

Péremption : 12 mois

Saveur	CODES EAN
Vanille	8445291839021
Café	8445291838499

DOSAGE RECOMMANDÉ

1 à 2 bouteilles par jour à adapter selon les recommandations médicales, à l'âge, aux besoins et à l'état du patient. Penser à boire suffisamment d'eau entre les prises.

AVIS IMPORTANT

- Utiliser sous contrôle médical
- Il convient de s'assurer que la consistance est adaptée aux capacités de déglutition du patient
- Nutrition orale en complément de l'alimentation
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
- A utiliser avec précaution chez les enfants de 3 à 10 ans
- A utiliser avec précaution chez les personnes sous anticoagulant (anti-vitamine K)
- Ne pas utiliser par voie intraveineuse (I.V.)

CONSEILS D'UTILISATION

- Verser dans un verre adapté aux capacités de déglutition du patient
- À consommer de préférence frais. Pour conserver sa texture, ne pas chauffer le produit
- Non ouvert, conserver dans un endroit sec et frais
- Après ouverture, refermer la bouteille entamée, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures
- Si le produit est versé dans un autre récipient, bien recouvrir et consommer dans les 6 heures

CNO : Complément Nutritionnel Oral

IDDSI : International Dysphagia Diet Standardisation Initiative

1. Étude in vitro réalisée avec Clinutren® Boisson 2kcal Épaissie, Rapport du laboratoire ETH Zurich, août 2025.

Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Avec sucres et édulcorant. À utiliser sous contrôle médical pour les besoins nutritionnels des patients adultes en cas de dénutrition associée à des troubles de la déglutition (dysphagie oropharyngée). Il convient de s'assurer que la consistance est adaptée aux capacités de déglutition du patient. En complément de l'alimentation. Lire attentivement l'étiquette pour les patients sous anti-vitamines K. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, à utiliser avec précaution chez les enfants de 3 à 10 ans. Document destiné aux professionnels de santé. Novembre 2025.

Energie	kcal	200
	kJ	840
Lipides (36% kcal)	g	8,0
- acides gras saturés	g	1,1
- acides gras mono-insaturés	g	4,5
- acides gras poly-insaturés	g	1,9
Glucides (44% kcal)	g	22,0
- sucres	g	6,0
- lactose	< g	1,0
Protéines (20 % kcal)	g	10,0
Sel	g	0,22
Substances minérales		
Sodium	mg	90
Potassium	mg	240
Chlorure	mg	115
Calcium	mg	160
Phosphore	mg	150
Magnésium	mg	30
Fer	mg	1,6
Zinc	mg	1,6
Cuivre	mg	0,24
Manganèse	mg	0,47
Fluorure	mg	0,18
Sélénium	µg	12
Chrome	µg	12
Molybdène	µg	20
Iode	µg	22
Vitamines		
A	µg RE	160-225**
D	µg	2,6
E	mg	3,7
K***	µg	18
C	mg	22
Thiamine (B1)	mg	0,3
Riboflavine (B2)	mg	0,35
Niacine	mg/mg NE	1,8/ 4,0
B6	mg	0,48
Acide Folique	µg	55
B12	µg	0,45
Biotine	µg	9,5
Acide Panthothénique	mg	1,1
Contenu en eau	g	70
Osmolarité	mOsm/L	585

*Parmi les compléments nutritionnels oraux sur le marché français en juillet 2025

**Valeur pour la saveur vanille

***La teneur en vitamine K peut fortement varier

Code LPPR : 6173316

LISTE D'INGRÉDIENTS

SAVEUR VANILLE

Eau, sirop de glucose, protéines de **LAIT**, huile de colza, saccharose, épaississant (phosphate de diamidon hydroxypropylé), minéraux (citrate de sodium, chlorure de potassium, citrate de magnésium, phosphate de potassium, chlorure de sodium, citrate de potassium, oxyde de magnésium, phosphate de fer, sulfate de zinc, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénate de sodium), émulsifiant (E471), vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, B6, thiamine, riboflavine, A, acide folique, K, biotine, D, B12), arôme, correcteurs d'acidité (E525, E330), stabilisant (gomme gellane), édulcorant (acésulfame K), colorant (E160a).
Stérilisé UHT. Sans gluten.



SAVEUR CAFÉ

Eau, sirop de glucose, protéines de **LAIT**, huile de colza, saccharose, épaississant (phosphate de diamidon hydroxypropylé), minéraux (citrate de sodium, chlorure de potassium, phosphate de potassium, citrate de magnésium, chlorure de sodium, citrate de potassium, oxyde de magnésium, phosphate de fer, sulfate de zinc, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénate de sodium), émulsifiant (E471), colorant (caramel ordinaire), vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, B6, thiamine, A, riboflavine, acide folique, K, biotine, D, B12), correcteurs d'acidité (E525, E330), arôme, stabilisant (gomme gellane), édulcorant (acésulfame K).
Stérilisé UHT. Sans gluten.



Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Avec sucres et édulcorant. À utiliser sous contrôle médical pour les besoins nutritionnels des patients adultes en cas de dénutrition associée à des troubles de la déglutition (dysphagie oropharyngée). Il convient de s'assurer que la consistance est adaptée aux capacités de déglutition du patient. En complément de l'alimentation. A utiliser avec précaution chez les personnes sous anticoagulant (anti-vitamine K). Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, à utiliser avec précaution chez les enfants de 3 à 10 ans.

Site de production : France (Creully Sur Seullès)

